

DOI: 10.32364/2587-6821-2022-6*-1-8

Панавир® в комплексной профилактике реактивации герпесвирусных инфекций у детей с рецидивирующими инфекциями органов респираторного тракта

Е.В. Мелехина^{1,2}, А.Д. Музыка¹, Е.Ю. Солдатова¹, Т.В. Шалбарова¹¹ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия²ГАУЗ МО «Химкинская ОБ», Химки, Россия

РЕЗЮМЕ

Введение: актуальность разработки терапевтических методов профилактики реактивации герпесвирусных инфекций (ГВИ) у детей обусловлена высокой частотой реактивации через 3–6 мес. после проведения клинически успешного курса противовирусной терапии манифестных форм с применением препаратов прямого противовирусного действия.

Цель исследования: анализ клинической и вирусологической эффективности комплексной терапии с включением спрея Панавир® Инлайт в профилактике реактивации ГВИ у детей.

Материал и методы: в ходе наблюдательной программы было обследовано 76 пациентов, из них 35 (46,1%) девочек и 41 (53,9%) мальчик, в возрасте от 0 до 14 лет, медиана возраста составила 5 (IQR 2–8) лет. Срок наблюдения — 3 мес. Основную группу составили 49 детей, которые получали Панавир® Инлайт спрей в составе комплексной терапии, группу сравнения — 27 детей, не получавших данный спрей. Схема применения Панавир® Инлайт спрей — по 1–2 впрыска в горло после еды, 3 курса по 14 дней с перерывами по 14 дней. Всем пациентам проводилось в динамике комплексное клиничко-лабораторное обследование. Диагностика ГВИ осуществлялась серологическими методами, а также методом ПЦР. Изучался уровень вирусной нагрузки ДНК вируса герпеса человека (ВГЧ) 6А/В, цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр в материале мазков из ротоглотки на фоне проводимой терапии.

Результаты исследования: исчезновение или уменьшение жалоб было зафиксировано у 38 (77,6%) пациентов основной группы и 15 (55,6%) детей в группе сравнения. На момент начала терапии у всех пациентов сравниваемых групп наблюдалось выделение ДНК одного или нескольких герпесвирусов в материале мазка из ротоглотки. После окончания курса терапии ДНК вирусов в ротоглотке не обнаруживались у 37 (75,5%) пациентов основной группы и у 16 (59,3%) пациентов группы сравнения. Медиана вирусной нагрузки ВГЧ-6А/В в ротоглотке снизилась с 645,0 (IQR 399,00–1600,00) копий/мл до 399,00 (IQR 0,00–775,00) копий/мл. По данным комплексного обследования зафиксировано уменьшение активности ГВИ у 27 (55,1%) пациентов, получавших Панавир® Инлайт спрей, и у 10 (37,0%) пациентов группы сравнения. На фоне проводимой терапии реактивация ГВИ достоверно реже была зафиксирована в основной группе — у 3 (6,1%) пациентов, чем в группе сравнения — у 10 (37,0%) пациентов ($p < 0,001$).

Заключение: применение спрея Панавир® Инлайт в комплексной профилактике реактивации ГВИ у детей с рекуррентными респираторными инфекциями способствует нормализации самочувствия и сохранению латентных форм ГВИ после курса терапии с применением препаратов прямого противовирусного действия. У пациентов, применявших Панавир® Инлайт спрей, зарегистрировано уменьшение вирусной нагрузки ДНК герпесвирусов в материале мазков из ротоглотки, наиболее выраженное в отношении ВГЧ-6А/В.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, рекуррентные инфекции органов респираторного тракта, герпесвирусные инфекции, Панавир Инлайт спрей.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мелехина Е.В., Музыка А.Д., Солдатова Е.Ю., Шалбарова Т.В. Панавир® в комплексной профилактике реактивации герпесвирусных инфекций у детей с рецидивирующими инфекциями органов респираторного тракта. РМЖ. Медицинское обозрение. 2022;6(*):1–8. DOI: 10.32364/2587-6821-2022-6*-1-8.

Panavir in combination with other drugs for the prevention of herpesvirus infection reactivation in children with recurring respiratory infections

E.V. Melekhina^{1,2}, A.D. Muzyka¹, E.Yu. Soldatova¹, T.V. Shalbarova¹¹Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Moscow, Russian Federation²Khimki Regional Hospital, Khimki, Russian Federation

ABSTRACT

Background: the importance of developing therapeutic options for the prevention of herpesvirus infection (HVI) reactivation in children is underpinned by a high prevalence of recurring diseases. Such recurrences with clinical manifestations are reported within 3 – 6 months after the clinically effective courses of antiviral therapy including direct-acting antivirals.

Aim: to assess the clinical and virological efficacy of combined therapy which includes Panavir® Inlight Spray for the prevention of HVI reactivation in children.

Patients and Methods: within the follow-up program, the clinical assessment was performed in 76 patients, comprising 35 (46.1%) girls and 41 (53.9%) boys, 0 – 14 years old, with a median age of 5 (IQR 2–8) years. The follow-up period was 3 months. The treatment group consisted of 49 children who received Panavir® Inlight Spray as a part of the combination therapy. The control group consisted of 27 children to whom Panavir® Inlight Spray was not administered. Panavir® Inlight Spray dosage regimen: 1 or 2 sprays in the throat after meals, 3 treatment courses, 14 days each, spaced 14 days apart. Clinical examinations and laboratory tests were performed for all patients over multiple time points. Serological and PCR methods were used for HHV diagnosing. The viral DNA load was evaluated for human herpes virus (HHV) 6A/B, cytomegalovirus, and Epstein-Barr virus in the oropharyngeal smears during the treatment.

Results: 38 (77.6%) patients of the treatment group and 15 (55.6%) children of the control group reported that the subjective symptoms disappeared or decreased. At the time of initiating therapy, DNA of one or more herpesviruses was isolated in the oropharyngeal smears of all patients from the compared groups. After the therapy completion, the viral DNA was not isolated in the oropharyngeal smears of 37 (75.5%) patients of the treatment group and in 16 (59.3%) patients of the control group. Median HHV 6A/B load in the oropharynx decreased from 645.0 (IQR 399.00–1600.00) copies/ml to 399.00 (IQR 0.00–775.00) copies/ml. Based on the results of complex assessment of patients, a reduction of HHV activity was found in 27 (55.1%) patients receiving Panavir® Inlight Spray and in 10 (37.0%) control group patients. Amid the administered therapy, the rate of HHV reactivation was significantly lower in the treatment group – in 3 (6.1%) patients than in the comparison group – in 10 (37.0%) patients ($p < 0,001$).

Conclusion: the use of Panavir® Inlight Spray in combination with other drugs for preventing HHV reactivation in children with recurring respiratory infections helps to improve the general sense of well-being and to preserve HHV latency after the treatment course containing direct antivirals. A decrease in the viral DNA load in the oropharyngeal smears (the most pronounced for HHV 6A/B) was reported in patients receiving Panavir® Inlight Spray.

KEYWORDS: children, recurring respiratory infections, herpesvirus infections, Panavir Inlight Spray.

FOR CITATION: Melekhina E.V., Muzyka A.D., Soldatova E.Yu., Shalbarova T.V. Panavir in combination with other drugs for the prevention of herpesvirus infection reactivation in children with recurring respiratory infections. *Russian Medical Inquiry*. 2022;6(*):2–8 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2022-6-*2-8.

ВВЕДЕНИЕ

Важным вопросом наблюдения пациентов с рецидивирующими инфекциями органов респираторного тракта являются вопросы профилактики реактивации герпесвирусных инфекций (ГВИ) с применением топических препаратов, имеющих доказанный высокий профиль безопасности.

Большинство эпизодов острых респираторных инфекций (ОРИ), возникающих у детей, имеют вирусное происхождение [1]. В литературе представлены данные о роли реактивации ГВИ у детей с рекуррентными ОРИ [2, 3] и о необходимости обследования детей с рецидивирующими ОРИ на ГВИ [4].

Проведенные нами исследования показали, что среди детей с активной ГВИ (вирус герпеса человека (ВГЧ) 6A/B, вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1)) через 3 мес. наблюдения от начала противовирусной терапии (ПВТ) у 89 (84%) пациентов был получен положительный клинический эффект (уменьшение количества ОРИ — у 20 детей, отсутствие ОРИ в течение 3 мес. — у 69 детей). Инфекция, вызванная ВГЧ-6A/B, установлена у 35% пациентов, ВЭБ — у 12%, ВПГ-1 — у 9%, ЦМВ — у 3%. ГВИ сочетанной этиологии имели место у 41% пациентов, из них наиболее часто выявлялось сочетание ВГЧ-6A/B + ВЭБ — у 23%, реже ВГЧ-6A/B + ВПГ-1 — у 9%, ВГЧ-6A/B + ВЭБ + ВПГ-1 — у 5%, ВГЧ-6A/B + ЦМВ — у 2%, ВГЧ-6A/B + ВЭБ + ЦМВ — у 2%.

После проведения курса ПВТ снижение активности ГВИ зафиксировано у 79 (76%) пациентов (у 59 из них после терапии были диагностированы латентные формы ГВИ, у 20 пациентов с ГВИ сочетанной этиологии латентной стала одна из ГВИ). То есть динамика лабораторных показателей несколько запаздывала по сравнению с купированием клинических проявлений заболевания (рис. 1) [5].

Через 3 мес. после окончания ПВТ с использованием препаратов инозина пранобекс, ацикловир, валацикловир был проведен анализ динамики частоты эпизодов ОРИ за период, прошедший с начала наблюдения. На момент начала наблюдения 77% детей после курса ПВТ препаратами прямого противовирусного действия за предыдущие 3 мес.

не болели ОРИ ни разу, 23% детей болели 1–2 раза в месяц с повышением температуры более 38 °С, получали только местную терапию (т. е. заболевание протекало легче, чем до терапии). У детей, которые не получали профилактику реактивации ГВИ, через 3 мес. наблюдалось улучшение в 11% случаев, отсутствие динамики — в 44%, ухудшение — в 44%, а через 6 мес. реактивация имела место у 100% обследованных. Отсутствие профилактики реактивации инфекции ВГЧ-6A/B у детей с рецидивирующими ОРИ и положительной динамикой клинико-лабораторных показателей после курса ПВТ ведет к возникновению реактивации в 100% через 6 мес. Этот факт объясняет необходимость клинико-лабораторного контроля состояния детей, перенесших клинически манифестные формы ГВИ минимум в течение 6 мес. [5].

Панавир® — линейка российских противовирусных препаратов растительного происхождения с широким спектром антивирусного действия. Панавир® является биологически активным полисахаридом, который получен из растения *Solanum tuberosum* (паслен клубненосный).




Рис. 1. Эффективность проводимой терапии на первом этапе исследования [5]

Fig. 1. Efficacy of the administered therapy during the first stage of the trial [5]

Действующим веществом препарата являются высокомолекулярные полисахаридные частицы. S. Stobun et al. [6] показали, что противовоспалительная активность препарата Панавир® в 4–8 раз усиливает секрецию АТФ и фактора ингибирования миграции макрофагов клетками HL-60. Данный эффект опосредован активным фагоцитозом частиц Панавира клетками.

Российскими исследователями была продемонстрирована эффективность и безопасность Панавир® (суппозитории ректальные) у детей с ОРВИ и гриппом. В группе пациентов, которые получали Панавир®, быстрее наступало выздоровление, нормализация температуры, купирование интоксикации и катаральных явлений. В соответствии с данными анкетирования по Интегральной шкале оценки удовлетворенности результатами лечения (Integrative Medicine. Patient Satisfaction, IMPSS) полная удовлетворенность результатами лечения родителями/усыновителями пациентов отмечалась в 80% случаев в группе Панавира и в 25% случаев в группе плацебо [7]. Ранее В.И. Кузнецов и соавт. [8] провели оценку эффективности Панавира в профилактике и лечении ОРВИ у взрослых. Авторы показали, что применение спрея Панавир® Инлайт приводило к сокращению продолжительности заболевания в среднем на 3,35 дня, уменьшению продолжительности лихорадки, катаральных явлений и выраженности головной боли, кашля, озноба, насморка, слабости. При назначении средства с профилактической целью имело место положительное влияние на показатели иммунитета. Эффективность спрея Панавир® Инлайт при комплексном лечении гриппа и ОРВИ у взрослых пациентов инфекционного стационара изучалась Л.И. Ткаченко и соавт. [9]. Использование спрея Панавир® Инлайт способствовало купированию катаральных проявлений: боли и першения в горле и гиперемии ротоглотки, оказывало положительное влияние на местный иммунитет (sIgA), сокращало продолжительность пребывания в стационаре.

Таким образом, показана эффективность при ОРВИ спрея Панавир® Инлайт у взрослых, а также ректальных суппозиториях Панавир® Инлайт у детей. Исследования эффективности применения спрея Панавир® Инлайт у детей с ГВИ ранее не проводилось.

Цель настоящего исследования: анализ клинической и вирусологической эффективности комплексной терапии с включением спрея Панавир® Инлайт в профилактике ОРВИ у детей на фоне реактивации ГВИ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В наблюдательную программу включались дети в возрасте от 1 до 12 лет до начала применения препаратов прямого противовирусного действия с жалобами на ежемесячные ОРВИ в течение последних 3 мес. либо с подтвержденной реактивацией ГВИ, а также пациенты с сохраняющимся выделением ДНК герпесвирусов из ротоглотки или ротоглотки и крови после окончания курса ПВТ.

Критериями исключения были: возраст менее 1 года и старше 12 лет; отсутствие ежемесячных ОРВИ; отсутствие подтвержденной реактивации ГВИ до начала противовирусного лечения либо отсутствие выделения ДНК герпесвирусов из ротоглотки или ротоглотки и крови после окончания курса ПВТ с применением препаратов прямого противовирусного действия; наличие первичных иммунодефицитных состояний.

Наблюдение осуществлялось в течение 3 мес. Всем пациентам проводилось в динамике комплексное клинико-лабораторное обследование. Диагностика ГВИ осуществлялась серологическими методами, а также методом ПЦР. Методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией результатов анализа в режиме реального времени в образцах периферической крови, мазках из ротоглотки выявляли и количественно определяли ДНК ЦМВ, ВГЧ-6А/В, ВЭБ. ПЦР-исследование проводили при помощи наборов реагентов, разработанных в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Методом ИФА определяли вирус-специфические Ig M и G к белкам ВПГ-1, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6А/В.

Всего было обследовано 76 пациентов в возрасте от 0 до 14 лет, медиана возраста составила 5 лет (IQR 2–8 лет): 35 (46,1%) девочек и 41 (53,9%) мальчик.

Общая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Основную группу составили 49 детей, которые получали Панавир® Инлайт спрей в составе комплексной терапии, в группу сравнения включены 27 детей. Схема приема — по 1–2 впрыска в горло после еды на 14 дней, 14 дней перерыв, затем 14 дней повторить (всего 3 курса). Группы были сопоставимы по возрасту полу, основным характеристикам, а также сопутствующей терапии (табл. 2).

Критериями эффективности (табл. 3), которые оценивались у пациентов, были: клиническая эффективность, оценка уровня выделения ДНК герпесвирусов количественно и качественно в ротоглотке до и после терапии спреем Панавир® Инлайт, вирусологическая эффективность на основании комплексного обследования с применением прямых и непрямых методов диагностики, как суммарная, так и по нескольким вирусам отдельно (ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6А/В).

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 2.8.8 (разработчик — ООО «Стат-

Таблица 1. Клинические характеристики обследованных пациентов

Table 1. Clinical characteristics of assessed patients

Показатель Indicator	Количество пациентов, n (%) Number of patients, n (%)
Пол: / Gender: женский / female мужской / male	35 (46,1) 41 (53,9)
Субфебрилитет: / Subfebrile condition: отсутствие / absence наличие / presence	71 (93,4) 5 (6,6)
Шейная лимфаденопатия: / Cervical lymphadenopathy: отсутствие / absence наличие / presence	53 (69,7) 23 (30,3)
Снижение абсолютного количества нейтрофилов относительно возрастной нормы по данным ОАК: Total blood count: decrease in absolute neutrophil count vs age-appropriate normal range: отсутствие / absence наличие / presence	62 (81,6) 14 (18,4)
Спленомегалия: / Splenomegaly: отсутствие / absence наличие / presence	73 (96,1) 3 (3,9)

Таблица 2. Терапия, проводимая у пациентов обследованных групп

Table 2. Therapy administered to patients of the studied groups

Препарат Drug	Количество пациентов, n (%) Number of patients, n (%)
Алпизарин / Alpizarin	
отсутствие / absence	52 (68,4)
наличие / presence	24 (31,6)
Гипорамин / Hiporhamin	
отсутствие / absence	68 (89,5)
наличие / presence	8 (10,5)
Анаферон / Anaferon	
отсутствие / absence	75 (98,7)
наличие / presence	1 (1,3)
Исмиген / Ismigen	
отсутствие / absence	75 (98,7)
наличие / presence	1 (1,3)
Лимфомиозот / Lymphomyosot	
отсутствие / absence	72 (94,7)
наличие / presence	4 (5,3)

тех», Россия). Количественные показатели описывались как средние значения (M) и стандартные отклонения (SD) с указанием границ 95% доверительного интервала (95% ДИ) (при нормальном распределении) или как медианы (Me), нижний и верхний квартили (Q1–Q3) (при распределении, отличном от нормального). Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение двух независимых групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, выполнялось с помощью t-критерия Стьюдента, если распределение отличалось от нормального — с помощью U-критерия Манна — Уитни. Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона, точного критерия Фишера. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При включении в наблюдательную программу все пациенты предъявляли жалобы на ежемесячные ОРВИ, субфебрилитет, длительную заложенность носа и др. После лечения исчезновение или уменьшение жалоб было зафиксировано у 38 (77,6%) пациентов основной группы и 15 (55,6%) детей в группе сравнения, активные жалобы сохранялись у 11 (22,4%) и 12 (44,4%) пациентов соответственно ($p=0,046$).

Показатели клинического анализа крови до начала лечения были сопоставимы в сравниваемых группах. После лечения у пациентов группы сравнения достоверно чаще отмечалось повышение СОЭ, а также наблюдался моноцитоз, что, вероятно, связано с реактивацией ГВИ (табл. 4).

Таким образом, назначение спрея Панавир® Инлайт у детей с рецидивирующими ОРВИ после проведения основного курса терапии препаратами с прямым противовирусным действием способствовало уменьшению жалоб и нормализации самочувствия в 77,6% случаев (в 1,5 раза чаще, чем в группе сравнения), тогда как в группе сравнения у 11 (40,7%) детей сохранялись жалобы, у 1 (3,7%) наблюдалось появление новых жалоб.

Таким образом, при включении пациентов в исследование показатели клинического анализа крови были сопоставимы в сравниваемых группах. Анализ динамики показателей до и после терапии в обеих группах не выявил достоверных различий. Однако после лечения у пациентов группы сравнения повышение СОЭ и моноцитоз после лечения регистрировались чаще, чем у пациентов основной группы.




Рис. 2. Доля пациентов с положительной динамикой показателей активности ГВИ в зависимости от проводимой профилактики реактивации

Fig. 2. Percentage of patients with the improved HHV activity indicators over time, depending on the conducted prophylaxis of reactivation

Таблица 3. Критерии оценки клинической и вирусологической профилактической эффективности

Table 3. Criteria of the assessment of the clinical and virological prophylaxis efficacy

Признак Indicator	Клиническая эффективность лечебного курса Clinical efficacy of the treatment course	Вирусологическая эффективность Virological efficacy
Улучшение Improvement	Уменьшение количества ОРВИ и/или тяжести их течения Reduction in the number of ARI and/or their clinical severity	Уменьшение локусов выделения ДНК и/или антигенов герпесвирусов по результатам прямых методов диагностики / Decrease in herpesvirus DNA and/or antigen isolation loci based on direct diagnostic methods
Без ухудшения Without deterioration	Отсутствие динамики тяжести и частоты ОРВИ No changes in clinical severity and ARI frequency over time	Отсутствие динамики вирусологических показателей по результатам прямых методов диагностики / No changes in virology indicators over time based on direct diagnostic methods
Ухудшение Deteriorating condition	При увеличении частоты и тяжести ОРВИ Amid the increase in frequency and severity	Признаки реактивации ГВИ / HHV reactivation signs

Таблица 4. Показатели клинического анализа крови до лечения
Table 4. Complete blood count indicators before treatment

Показатель Indicator	Группа Group	До лечения / Before treatment				После лечения / After treatment			
		<i>M</i> ± <i>SD</i> / <i>Me</i>	95% ДИ / CI Q_1-Q_3	<i>n</i>	<i>p</i>	<i>M</i> ± <i>SD</i> / <i>Me</i>	95% ДИ / CI Q_1-Q_3	<i>n</i>	<i>p</i>
Лейкоциты, 10 ⁹ /л Leucocytes, 10 ⁹ /l	Основная Treatment	7,20	5,82–8,73	46	0,493	6,57±1,70	5,72–7,41	18	0,904
	Сравнения Control	6,82	4,85–8,73	26		6,64±2,19	5,74–7,54	25	
Палочкоядерные нейтрофилы, % Band neutrophils, %	Основная Treatment	1,00	1,00–1,00	46	0,518	1,00	1,00–1,00	18	0,785
	Сравнения Control	1,00	1,00–1,00	26		1,00	1,00–1,00	25	
Сегментоядерные нейтрофилы, % Segmented neutrophils, %	Основная Treatment	38,03±12,72	34,25–41,81	46	0,906	39,72±11,64	33,94–45,51	18	0,522
	Сравнения Control	38,40±12,69	33,28–43,52	26		36,92±15,53	30,51–43,33	25	
Нейтрофилы, 10 ⁹ /л Neutrophils, 10 ⁹ /l	Основная Treatment	2,89±1,50	2,42–3,36	42	0,822	2,23	1,91–2,60	16	0,575
	Сравнения Control	2,81±1,38	2,25–3,36	26		2,50	1,85–3,41	25	
Эозинофилы, % Eosinophils, %	Основная Treatment	2,30	1,00–4,00	46	0,765	3,00	2,00–4,00	17	0,466
	Сравнения Control	2,00	2,00–3,75	26		3,00	2,00–3,00	25	
Базофилы, % Basophils, %	Основная Treatment	1,00	0–1,00	42	0,253	0	0–1,00	16	0,878
	Сравнения Control	0	0–1,00	23		0	0–1,00	25	
Моноциты, % Monocytes, %	Основная Treatment	8,50	7,00–10,00	46	0,726	7,00	6,00–10,00	17	0,078
	Сравнения Control	8,00	7,00–10,00	26		8,00	7,00–10,00	25	
Лимфоциты, % Lymphocytes, %	Основная Treatment	46,85	40,50–56,50	46	0,801	47,35±12,34	41,01–53,70	17	0,995
	Сравнения Control	48,50	41,75–55,75	26		47,32±19,15	39,42–55,22	25	
СОЭ, мм/ч ESR, mm/h	Основная Treatment	3,00	2,00–7,25	44	0,278	2,00	2,00–5,00	17	0,025*
	Сравнения Control	4,50	3,25–6,75	26		6,00	3,75–7,25	24	

Примечание. * — различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$).

Note. * — statistically significant differences between the indicators ($p < 0,05$).

На момент начала терапии у всех пациентов сравниваемых групп наблюдалось выделение одного или нескольких герпесвирусов в материале из ротоглотки. В этиологической структуре вирусывыделения в ротоглотке преобладал ВГЧ-6А/В — у 64 (82%) пациентов (из них у 39 (61%) в моноварианте), ВЭБ — у 26 (39%) (из них у 6 (23%) в моноварианте), ЦМВ — у 12 (16%) (из них у 5 (41%) в моноварианте).

При анализе выделения вирусов в материале из ротоглотки у пациентов основной группы было установлено, что после лечения ДНК вирусов в ротоглотке не обнаруживалась у 37 (75,5%) детей, 1 вирус выделен у 10 (20,4%) детей, 2 вируса — у 2 (4,1%).

В группе сравнения количество пациентов с отсутствием выделения вирусов из ротоглотки после лечения составило 16 (59,3%), 1 вирус обнаружен у 10 (37,0%) пациентов, 2 вируса — у 1 (3,7%) обследованного ($p < 0,001$) (табл. 5).

Проведен анализ выделения каждого из исследуемых вирусов по результатам ПЦР-исследования качественным и количественным методом. ДНК ВГЧ-6А/В в основной группе до лечения обнаруживалась у 40 (81,6%) пациентов, после лечения — у 10 (20,4%) пациентов, в группе сравнения — у 24 (88,9%) и 10 (37,0%) соответственно. При анализе связанных совокупностей установлено снижение доли пациентов с выделением ВГЧ-6А/В в каждой из групп ($p < 0,001$). При анализе доли пациентов с выделением ДНК ВГЧ-6А/В в ротоглотке после лечения показано, что ВГЧ-6А/В чаще выделяется у пациентов группы сравнения — 10 (37%) против 10 (20,4%) пациентов, получавших Панавир® Инлайт спрей ($p = 0,173$).

Таблица 5. Динамика выделения вирусов из ротоглотки
Table 5. Changes in virus isolations from the oropharynx over time

Группа Group	Количество вирусов Number of viruses	Этапы наблюдения Follow-up stage		p
		До / Before	После / After	
		Абс. / Abs. %	Абс. / Abs. %	
Основная Treatment	0	0	37 (75,5)	<0,001*
	1	31 (63,3)	10 (20,4)	
	2	18 (36,7)	2 (4,1)	
Сравнения Control	0	0	16 (59,3)	<0,001*
	1	19 (70,4)	10 (37,0)	
	2	8 (29,6)	1 (3,7)	
p		0,618**	0,287**	-

Примечание. * — проводился анализ доли пациентов с 0, 1 и 2 вирусами на двух этапах наблюдения (до и после лечения); ** — проводилось сравнение доли пациентов с 0, 1 и 2 вирусами между основной группой и группой сравнения.

Note. * — assessment of the percentage of patients with 0, 1 and 2 viruses was performed during two stages of follow-up (before and after treatment); ** — comparison of the percentage of patients with 0, 1 and 2 viruses between the treatment and control groups was carried out.




Рис. 3. Суммарные показатели активности ГВИ в зависимости от проводимой терапии

Fig. 3. Aggregated indicators of HHV activity, depending on the administered therapy

При анализе результатов количественного исследования у пациентов основной группы установлено, что медиана вирусной нагрузки ВГЧ-6А/В в ротоглотке до лечения составила 645,0 (Q1–Q3 399,00–1600,00 копий/мл), а после лечения — 399,00 (Q1–Q3 0,00–775,00 копий/мл), $p=0,084$.

В основной группе ДНК ВЭБ до лечения обнаруживалась у 19 (38,8%) пациентов, после лечения — у 1 (2,0%) пациента, снижение доли пациентов с выделением вируса было статистически значимым ($p<0,001$); в группе сравнения — у 7 (25,9%) и 1 (3,7%) соответственно ($p=0,034$).

Выделение ЦМВ из материала ротоглотки у обследованных пациентов наблюдалось реже, чем ВЭБ и АГЧ-6А/В. Тем не менее была установлена тенденция к снижению доли детей, у которых обнаруживался вирус, после лечения: в основной группе — с 8 (16,3%) до 3 (6,1%) после лечения ($p=0,059$), в группе сравнения — с 6 (22,2%) до 1 (3,7%).

Таким образом, Панавир® Инлайт спрей в комплексной профилактике реактивации приводит к уменьшению выделения ДНК ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ-6А/В из ротоглотки. Наиболее выраженный эффект получен в отношении ВГЧ-6А/В.

На момент включения в исследование анти-ВПГ1, 2 и анти-ЦМВ IgM у пациентов сравниваемых групп отсутствовали. Анти-ВГЧ-6А/В IgM в основной группе до лечения выявлялись у 1 пациента, анти-VCA ВЭБ IgM выявлены у 2 детей в основной группе и у 1 ребенка в группе сравнения до терапии. После лечения IgM к анализируемым герпесвирусам отсутствовали у всех пациентов обеих групп. Медиана анти-ВГЧ-6А/В IgG в основной группе до лечения составила 630,00 (Q1–Q3: 190,00–1200,00), после лечения — 0 (Q1–Q3: 0,00–350,00) ($p=0,008$).

Было установлено, что подключение к комплексной терапии спрея Панавир® Инлайт не оказывало влияния на уровень анти-ВПГ-1, 2, анти-ВЭБ, анти-ЦМВ IgG, в то время как наблюдалось снижение уровня анти-ВГЧ-6А/В IgG в основной группе в динамике.

На основании оценки данных комплексного обследования пациентов до начала терапии и после нее была установлена стадия ГВИ. Активными формами инфекции считали реактивацию ГВИ, проявляющуюся лабораторно наличием анти-ГВИ IgM, ДНК и/или антигенов вируса в крови. К неактивным формам инфекции относили выявление анти-ГВИ IgG в крови и/или ДНК ГВИ в ротоглотке.

Изменение стадии ГВИ до и после терапии фиксировали для каждого вида ГВИ и суммарно: как «лучше» (переход в неактивную стадию), «хуже» (переход в активную стадию), «без изменения» (сохранение той же стадии).

Полученные данные представлены на рисунке 2.

Важно отметить, что в обеих группах были пациенты, у которых отмечена отрицательная динамика активности инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В. В группе сравнения такие наблюдения преобладали по сравнению с основной группой: 14 (28,5%) против 5 (18,8%), $p>0,05$.

Итоговое изменение активности ГВИ на фоне проводимой терапии оценивали на основании уменьшения лабораторной активности инфекции в случае моно-ГВИ и по уменьшению активности хотя бы одной из ГВИ.

Результаты представлены на рисунке 3.

Отрицательная динамика лабораторных показателей, отражающих суммарную активность ГВИ, наблюдалась у пациентов, которые не получали Панавир® Инлайт спрей, — 37%, что достоверно выше, чем в группе детей, которые получали Панавир® Инлайт спрей, — 6% ($p<0,001$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Герпесвирусные инфекции являются первично-хроническими плеiotропными инфекциями, снижающими иммунную реактивность макроорганизма. Инфицирование происходит преимущественно в детском возрасте, а лабораторные маркеры инфекции сохраняются в течение всей жизни.

Рекуррентные респираторные инфекции представляют собой социально значимые состояния в педиатрической практике и в ряде случаев связаны с реактивацией ГВИ [10, 11].

Проведение курсов ПВТ показало свою эффективность [4], однако длительность курсов ограничена в связи с возможностью развития побочных эффектов. С учетом высокого процента реактивации ГВИ через 3 и 6 мес. после

окончания ПВТ встает вопрос о необходимости проведения безопасной профилактики реактивации ГВИ с помощью, например, спрея Панавир® Инлайт.

Выделение ДНК герпесвирусов в материале мазков из ротоглотки является распространенным лабораторным маркером ГВИ и не всегда коррелирует с клиническими проявлениями инфекционного процесса [12]. Однако именно этот показатель наиболее часто и длительно сохраняется после купирования проявлений заболевания и исчезновения ДНК и/или антигенов герпесвирусов из крови.

Учитывая вышесказанное, мы применили спрей растительного происхождения Панавир® Инлайт, имеющий противовирусную активность (в том числе и в отношении герпесвирусов), в комплексной профилактике реактивации ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6А/В. Группу сравнения составили пациенты, сопоставимые с опытной группой по возрастными и гендерным характеристикам, а также по этиологической структуре выявленных у них ГВИ, не получавшие Панавир® Инлайт спрей в комплексной профилактике.

Нами оценивалось клиническое состояние пациентов по динамике жалоб, активность ГВИ на основании комплексного обследования, включавшего прямые и непрямые методы диагностики. Вирусная нагрузка ДНК герпесвирусов в материале мазков из ротоглотки до и после терапии в обеих группах определялась качественными и количественными методами ПЦР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показано, что применение спрея Панавир® Инлайт в комплексной профилактике реактивации ГВИ у детей с рецидивирующими ОРВИ приводит к клиническому улучшению состояния в 77,6% случаев против 55,6% случаев в группе сравнения. Назначение данного спрея пациентам, у которых выделяется ДНК герпесвирусов в ротоглотке, приводит к уменьшению вирусной нагрузки вдвое в этом локусе. Наибольший эффект получен в отношении инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В. По данным комплексного обследования, применение спрея Панавир® Инлайт достоверно чаще приводило к переходу ГВИ в латентное состояние и поддерживало ГВИ в длительном латентном состоянии после курса ПВТ с применением препаратов прямого противовирусного действия. Полученные в ходе исследования результаты позволяют рекомендовать Панавир® Инлайт спрей в комплексной терапии ГВИ пациентам старше 1 года с выделением ДНК герпесвирусов в материале мазков из ротоглотки. ▲

Литература

1. Esposito S., Jones M.H., Feleszko W. et al. Prevention of New Respiratory Episodes in Children with Recurrent Respiratory Infections: An Expert Consensus Statement. *Microorganisms*. 2020;8(11):1810. DOI: 10.3390/microorganisms8111810.
2. Боковой А.Г., Егоров А.И. Герпесвирусные инфекции у детей и родителей: учебное пособие для врачей педиатров, инфекционистов, иммунологов. Хабаровск: Полиграф — Партнер; 2016.
3. Романцов М.Г., Ершов Ф.И. Часто болеющие дети. Современная фармакотерапия: Руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009.
4. Лысенкова М.Ю., Каражас Н.В., Мелехина Е.В. и др. Герпесвирусные инфекции у детей с рецидивирующими респираторными заболеваниями. *Детские инфекции*. 2018;17(2):17–20. DOI: 10.22627/2072-8107-2018-17-2-17-21.
5. Мелехина Е.В. Инфекция, вызванная HUMAN BETAHERPESVIRUS 6A/B, у детей: клинико-патогенетические аспекты, диагностика и терапия: автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. М., 2019.
6. Stovbun S.V., Kalinina T.S., Zlenko D.V. et al. Antiviral potential of plant polysaccharide nanoparticles actuating non-specific immunity. *Int J Biol Macromol*. 2021;182:743–749. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.03.135.

7. Лукашова Л.В., Афанасьева О.И., Портнягина Е.В. и др. Лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций у детей: результаты многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного сравнительного клинического исследования. *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. 2021;66(1):131–139. DOI: 10.21508/1027-4065-2021-66-1-131-139.
8. Кузнецов В.И., Вялов С.С. Острые респираторные вирусные инфекции: как лечить и предупреждать эффективно? *Поликлиника*. 2009;5:85–88.
9. Ткаченко Л.И., Ртищева Л.В., Дохов М.Б. и др. Новые возможности повышения эффективности терапии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. *Профилактическая медицина*. 2018;21(5):113–116. DOI: 10.17116/profmed201821051113.
10. Schaad U.B., Esposito S., Razi C.H. Diagnosis and Management of Recurrent Respiratory Tract Infections in Children: A Practical Guide. *Arch Pediatr Infect Dis*. 2016;4(1):e31039. DOI: 10.5812/pedinf.31039.
11. Chiappini E., Santamaria F., Marseglia G.L. et al. Prevention of recurrent respiratory infections: Inter-society Consensus. *Ital J Pediatr*. 2021;47(1):211. DOI: 10.1186/s13052-021-01150-0.
12. Пермякова А.В., Дерюшева А.Ю. Заболеваемость, вызванная Human Herpesvirus, у детей дошкольного возраста: проблемы и решения. *Детские инфекции*. 2020;4(73):50–53. DOI: 10.22627/2072-8107-2020-19-4-50-53.

References

1. Esposito S., Jones M.H., Feleszko W. et al. Prevention of New Respiratory Episodes in Children with Recurrent Respiratory Infections: An Expert Consensus Statement. *Microorganisms*. 2020;8(11):1810. DOI: 10.3390/microorganisms8111810.
2. Bokovoi A.G., Egorov A.I. Herpesvirus infections in children and parents: a textbook for pediatricians, infectious disease specialists, immunologists. Khabarovsk: Poligraf — Partner; 2016 (in Russ.).
3. Romantsov M.G., Yershov F.I. Frequently ill children. *Modern pharmacotherapy: A guide for physicians*. M.: GEOTAR-Media; 2009 (in Russ.).
4. Lysenkova M.Yu., Karazhas N.V., Melekhina E.V. et al. Herpesvirus infections in children with recurrent respiratory diseases. *Detskie Infektsii*. 2018;17(2):17–20 (in Russ.). DOI: 10.22627/2072-8107-2018-17-2-17-21.
5. Melekhina Ye.V. Infection caused by HUMAN BETAHERPESVIRUS 6A/B in children: clinical and pathogenetic aspects, diagnosis and therapy: thesis. M., 2019 (in Russ.).
6. Stovbun S.V., Kalinina T.S., Zlenko D.V. et al. Antiviral potential of plant polysaccharide nanoparticles actuating non-specific immunity. *Int J Biol Macromol*. 2021;182:743–749. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.03.135.
7. Lukashova L.V., Afanasyeva O.I., Portnyagina E.V. et al. Treatment of influenza and other acute respiratory viral infections in children: multicenter double-blind placebo-controlled randomized comparative clinical trial. *Ros Vestn Perinatol i Pediatr*. 2021;66(1):131–139 (in Russ.). DOI: 10.21508/1027-4065-2021-66-1-131-139.
8. Kuznetsov V.I., Vyalov S.S. Acute respiratory viral infections: how to treat and prevent effectively? *Poliklinika*. 2009;5:85–88 (in Russ.).
9. Tkachenko L.I., Rtischeva L.V., Dokhov M.B. et al. New opportunities to improve the efficiency of therapy for influenza and acute respiratory viral infections. *Profilakticheskaya Meditsina*. 2018;21(5):113–116 (in Russ.). DOI: 10.17116/profmed201821051113.
10. Schaad U.B., Esposito S., Razi C.H. Diagnosis and Management of Recurrent Respiratory Tract Infections in Children: A Practical Guide. *Arch Pediatr Infect Dis*. 2016;4(1):e31039. DOI: 10.5812/pedinf.31039.
11. Chiappini E., Santamaria F., Marseglia G.L. et al. Prevention of recurrent respiratory infections: Inter-society Consensus. *Ital J Pediatr*. 2021;47(1):211. DOI: 10.1186/s13052-021-01150-0.
12. Permyakova A.V., Deryusheva A.Yu. The incidence of Human Herpesvirus in preschool children: problems and solutions. *Detskie Infektsii=Children's Infections*. 2020;19(4):50–53 (in Russ.). DOI: 10.22627/2072-8107-2020-19-4-50-53.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Мелехина Елена Валериевна — д.м.н., доцент по специальности «педиатрия», в.н.с. клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А; врач-педиатр инфекционного отделения ГАУЗ МО «Химкинская ОБ»; 141407, Россия, г. Химки, Куркинское шоссе, д. 11; ORCID ID 0000-0002-9238-9302.

Музыка Анна Драгиевна — к.м.н., с.н.с. клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А; ORCID ID 0000-0002-2269-2533.

Солдатова Евгения Юрьевна — м.н.с. клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А; ORCID iD 0000-0002-0683-8010.

Шалбарова Татьяна Васильевна — лаборант-исследователь клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А; ORCID iD 0000-0003-3659-3592.

Контактная информация: Мелехина Елена Валерьевна, e-mail: e.melekhina@mail.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 23.08.2022.

Поступила после рецензирования 15.09.2022.

Принята в печать 10.10.2022

ABOUT THE AUTHORS:

Elena V. Melekhina — Dr. Sc. (Med.), associate professor in pediatrics, leading researcher of the Clinical Department of Infectious Diseases, Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being; 3A, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; pediatrician of the Infectious Diseases Department, Khimki

Regional Hospital; 11, Kurkinskoe road, Khimki, 141407, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-9238-9302.

Anna D. Muzyka — C. Sc. (Med.), senior researcher of the Clinical Department of Infectious Diseases, Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being; 3A, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-2269-2533.

Evgeniya Yu. Soldatova — junior researcher of the Clinical Department of Infectious Diseases, Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being; 3A, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0683-8010.

Tatyana V. Shalbarova — researcher technician of the Clinical Department of Infectious Diseases, Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being; 3A, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3659-3592.

Contact information: Elena V. Melekhina, e-mail: e.melekhina@mail.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 23.08.2022.

Revised 15.09.2022.

Accepted 10.10.2022.

Спрей для полости рта

Панавир® Инлайт

- ✓ Содержит противовирусный компонент
- ✓ Успокаивает раздраженную слизистую
- ✓ Способствует регенерации тканей
- ✓ Способствует уменьшению дискомфорта
- ✓ Обладает длительным защитным действием

